



EDWD. B. MARK.



Pl. 466. Schaeffer, Jacobi C.
~~Schaeffer~~ (Schaeffer, Jacobi C.
Icones insectorum circa
Ratisbonam...
Ratisbonae, 1791

3 vi 7

MBL/WHOI



0 0301 0049605 5

TABULA C.
Hundertste Tafel.

STERNK als ...
... mit ...

Fig. I

STERNK als ...
... mit ...

Fig. II

STERNK als ...
... mit ...

Fig. III

STERNK als ...
... mit ...

Fig. IV


STERNK als ...
... mit ...

Fig. V

D. IACOBI CHRISTIANI SCHAEFFERI
ICONES
INSECTORVM
CIRCA RATISBONAM
INDIGENORVM
COLORIBVS NATVRAM REFERENTIBVS
EXPRESSAE.
VOLUMEN II

Natürlich ausgemahlte
Abbildungen
Regensburgischer
Insecten.

Zweyter Band.



1791.

D. IACOBI CHRISTIANI SCHAEFFERI

ICONES
INSECTORVM
CIRCA RATISBONAM
INDIGENORVM
COLORIBVS NATVRAM REFERENTIBVS
EXPRESSAE
VOLUMEN II

Natürlich ausgemahlte

Abbildungen

Regensburgischer

Insecten

Zweiter Band



1791

**INSECTA
RATISBONENSIA**

VOL. II.

**Regensburgische
Insecten.**

Zweyter Band.

TABVLA CI.

Hundert und erste Tafel.

- Fig. I. **LEPTVRA** *thorace cylindraceo* NONA.
Neunter Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.
- Fig. II. III. **PHALAENA** *pectinicornis* *alis deflexis* DECIMA QVINTA.
Fünfzehnder Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. IV. **ICHNEVMON** *QVADRAGESIMVS PRIMVS.*
Ein und vierzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. **LEPTVRA** *thorace cylindraceo* DECIMA.
Zehender Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.
- Fig. VI. **CVRCVLIO** *femoribus muticis* DECIMVS NONVS.
Neunzehender Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. VII. **ARANEA** *oculorum situ semilunato* DVODECIMA.
Zwölfte Spinne mit Augen im halben Monde.

TABVLA CII.

Hundert und zweyte Tafel.

- Fig. I. II. *PHALAENA feticornis alis conuolutis TERTIA.*
 Dritter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und zusammengerollten Flügeln.
- Fig. III. *SCARABAEVS septem antennarum lamellis QVARTVS. MAS.*
 Vierter Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern. Männchen.
- Fig. IV. *SCARABAEVS septem antennarum lamellis QVINTVS. FEMINA.*
 Fünfter Maulwurfskäfer mit siebenspaltigen Fühlhörnern. Weibchen.
- Fig. V. *CRYPTOCEPHALVS vicesimvs PRIMVS.*
 Ein und zwanzigster Fallkäfer.
- Fig. VI. *MVSCA spathula antennarum oblonga DECIMA QVARTA.*
 Vierzehende Hausfliege mit länglichem Spadel.
- Fig. VII. VIII. *APIS tricesima QVINTA.*
 Fünf und dreyszigste Biene.

TABVLA CIII.

Hundert und dritte Tafel.

- Fig. I. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS SECVNDVS.
Zwey und funfzigste Schlupfwespe.
- Fig. II. III. CRABRO QVINTVS.
Fünfte Kolbenfliege.
- Fig. IV. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS TERTIVS.
Drey und funfzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. LEPTVRA thorace *plano* DECIMA SEXTA.
Sechzehender Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. VI. LEPTVRA thorace *plano* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehender Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. VII. a. b. CVRCVLIO femoribus *muticis* VICESIMVS.
Zwanzigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. VIII. a. b. CVRCVLIO femoribus *muticis* VICESIMVS PRIMVS.
Ein und zwanzigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

TABVLA CIV.

Hundert und vierte Tafel.

- Fig. I. II. CRABRÖ SEXTVS.
Sechste Kolbenfliege.
- Fig. III. MVSCA spathula antennarum fusiformi QVARTA.
Vierte Hausfliege mit spindelförmigem Spadel.
- Fig. IV. RHINOMACER DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender Afterrüsselkäfer.
- Fig. V. CVRCVLIO femoribus muticis VICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und zwanzigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. VI. a. b. ELATER antennis setaceis NONVS.
Neunter Springkäfer mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. CVRCVLIO femoribus muticis VICESIMVS TERTIVS
Drey und zwanzigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. VIII. IX. BIBIO SECVNDVS.
Zweyte Marcusfliege.
- Fig. X. XI. BIBIO TERTIVS.
Dritte Marcusfliege.

TABVLA CV.

Hundert und fünfte Tafel.

Fig. I. II. *APIS* TRICESIMA SEXTA.
Sechs und dreyssigste Biene.

Fig. III. IV. *PHALAENA seticornis alis deflexis* DECIMA SEXTA.
Sechzehnder Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

Fig. V. *ICHNEVMON* QVINQVAGESIMVS QVARTVS.
Vier und funfzigste Schlupfwespe.

Fig. VI. *TENTHREDO* antennis *setaceis* SEPTIMA.
Siebende Sägfliege mit borstigen Fühlhörnern.

Fig. VII. *TENTHREDO* antennis *filiformibus* QVINTA.
Fünfte Sägfliege mit fadenähnlichen Fühlhörnern.

Fig. VIII. a. b. *CVRCVLIO* femoribus *muticis* VICESIMVS QVARTVS.
Vier und zwanzigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

Fig. IX. a. b. *TELEPHORVS* *ouatus* QVINTVS.
Fünfter eyrader Warzenkäfer.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII. a.



Fig. IX. a.

Fig. VIII. b.



Fig. IX. b.



TABVLA CVI.

Hundert und fechste Tafel.

- Fig. I. LIBELLVLA alis patentibus NONA.
Neuntes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. II. APIS TRICESIMA SEPTIMA.
Sieben und dreyßsigste Biene.
- Fig. III. ASILVS DECIMVS QVARTVS.
Vierzehende Raubfliege.
- Fig. IV. ARANEA oculorum situ duarum linearum TERTIA.
Dritte Spinne mit Augen in zwo Reihen.
- Fig. V. VI. TIPVLA alis patentibus DECIMA. MAS.
Zehende Erdfliege mit offenen Flügeln. Männgen.
- Fig. VII. TIPVLA alis patentibus VNDECIMA. FEMINA.
Eilfte Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.

TABVLA CVII.

Hundert und siebende Tafel.

Fig. I.

HEMEROBIVS TERTIVS.
Dritter Blattlauslöwe.

Fig. II.

LEPTVRA thorace *globoso* DVODECIMA
Zwölfter Afterholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.

Fig. III.

LEPTVRA thorace *globoso* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Afterholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.

Fig. IV.

ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS QVINTVS.
Fünf und dreyssigste Schlupfwespe.

Fig. V.

MVSCA spathula antennarum *rotunda* DVODECIMA.
Zwölfte Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. VI.

MVSCA spathula antennarum *rotunda* DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. VII.

MVSCA spathula antennarum *rotunda* DECIMA QVARTA.
Vierzehende Hausfliege mit rundlichem Spadel.

TABVLA CVIII.

Hundert und achte Tafel.

- Fig. I. *LEPTVRA thorace plano DECIMA OCTAVA.*
Achtzehender Afterholzbock mit flachem Brustschilde.
- Fig. II. III. *PHALAENA feticornis alis deflexis DECIMA SEPTIMA.*
Siebenzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. IV. V. *PHALAENA feticornis alis deflexis DECIMA OCTAVA.*
Achtzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. VI. *MVSCA spathula antennarum truncata TERTIA.*
Dritte Hausfliege mit abgestutztem Spadel.
- Fig. VII. *MVSCA spathula antennarum oblonga DECIMA QUINTA.*
Fünfzehende Hausfliege mit länglichem Spadel.
- Fig. VIII. *CARABVS oblongus DECIMVS SEPTIMVS.*
Siebenzehender länglicher Laufkäfer.

TABVLA CIX.

Hundert und neunte Tafel.

- Fig. I. TENTHREDO *antennis setaceis* OCTAVA.
Achte Sägfliede mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. II. TENTHREDO *antennis clauatis* VNDECIMA
Eilfte Sägfliede mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. III. IV. PHRYGANEAE QVINTA.
Fünfte Frühlingsfliede.
- Fig. V. CARABVS *oblongus* DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehender länglicher Laufkäfer.
- Fig. VI. BVPRESTIS DECIMA QVARTA.
Vierzehender Stinkkäfer.
- Fig. VII. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und zwanzigste Fallkäfer.
- Fig. VIII. IX. CIMEX *quinque antennarum articulis* VICESIMVS SEXTVS.
Sechs und zwanzigste Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.

TABVLA CX.

Hundert und zehende Tafel.

- Fig. I. II. SPHINX *alis integris cauda simplici* DVODECIMA.
Zwölfter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.
- Fig. III. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS SEXTVS.
Sechs und funfzigste Schlupfwespe.
- Fig. IV. V. STRATIONYS OCTAVA.
Achte Waffenfliege.
- Fig. VI. TENTHREDO *antennis setaceis* NONA.
Neunte Sägfliede mit borstigen Fühlhörnern.

TABVLA CXI.

Hundert und eilfte Tafel.

ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS SEPTIMVS.

Fig. I. Sieben und funfzigste Schlupfwespe.

SPHINX alis *integris cauda pilosa* TERTIA.

Fig. II. III. Dritter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und haarigem Schwanze.

COCCVS PRIMVS. FEMINA.

Fig. IV. Erste Schildlausfliege. Weibgen.

TIPVLA alis *patentibus* DVODECIMA. MAS.

Fig. V. Zwölfte Erdfliege mit offenen Flügeln. Männchen.

TIPVLA alis *patentibus* DECIMA TERTIA. FEMINA.

Fig. VI. Dreyzehende Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.

PHALAENA *pedinicornis* alis *patentibus* SEXTA.

Fig. VII. Sechster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und offenen Flügeln.

TABVLA CXII.

Hundert und zwölfte Tafel.

- Fig. I. II. *PHALAENA seticornis alis planis DECIMA QUINTA.*
Fünfzehnder Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. III. *CHRYSOMELA TRICESIMA.*
Dreysigster Blattkäfer.
- Fig. IV. *LEPTVRA thorace conico DECIMA SEXTA.*
Sechzehnder Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.
- Fig. V. *APIS TRICESIMA OCTAVA.*
Acht und dreysigste Biene.
- Fig. VI. *BOMBYLIVS SEXTVS.*
Sechste Rüsselfliege.
- Fig. VII. *CIMEX quatuor antennarum articulis VICESIMVS SECVNDVS.*
Zwey und zwanzigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. VIII. *ARANEA oculorum situ semilunato DECIMA TERTIA.*
Dreyzehende Spinne mit Augen im halben Monde.
- Fig. IX. *PHALAENA seticornis alis patentibus OCTAVA.*
Achter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.

TABVLA CXIII.

Hundert und dreyzehende Tafel.

MVSCA *spathula antennarum rotunda* DECIMA QUINTA.

Fig. I. *Funfzehende Hausfliege mit rundlichem Spadel.*

APIS *tricesima nona*.

Fig. II. *Neun und dreyssigste Biene.*

VOLVCELLA *octava*.

Fig. III. *Achte Federbuschfliege.*

LIBELLVLA *alis patentibus* DECIMA.

Fig. IV. *Zehendes Jüngferchen mit offenen Flügeln.*

PHALAENA *seticornis alis deflexis* DECIMA NONA.

Fig. V. VI. *Neunzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.*

TENTHREDO *antennis setaceis* DECIMA.

Fig. VII. *Zehende Sägfliege mit borstigen Fühlhörnern.*

VESPA *decima sexta*.

Fig. VIII. *Sechzehende Wespe.*

ARANEA *oculorum situ duarum linearum* QVARTA.

Fig. IX. *Vierte Spinne mit Augen in zwei Reihen.*

TABVLA CXIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.




Fig. VI.



Fig. IX.




Fig. VII.



Fig. VIII.





TABVLA CXIV.
Hundert und vierzehende Tafel.

Fig. I. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS OCTAVVS.
Acht und funfzigste Schlupfwespe.

Fig. II. III. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* VICESIMA.
Zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

Fig. IV. V. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

Fig. VI. a. b. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS TERTIVS.
Drey und zwanzigster Falikäfer.

Fig. VII. NEMOTELVS DVODECIMVS.
Zwölft Stiletfliege.

Fig. VIII. TENTHREDO *antennis clauatis* DVODECIMA.
Zwölft Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.

TABVLA CXV.

Hundert und funfzehende Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *seticornis* alis *deflexis* VICESIMA SECUNDA.
Zwey und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.
- Fig. III. CHRYSIS QVARTA.
Vierte Goldwespe.
- Fig. IV. TENTHREDO *antennis setaceis* VNDECIMA.
Eilfte Sägfliege mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. V. TIPVLA alis *patentibus* DECIMA QVARTA. MAS.
Vierzehende Erdfliege mit offenen Flügeln. Männchen.
- Fig. VI. TIPVLA alis *patentibus* DECIMA QVINTA. FEMINA.
Funfzehende Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.
- Fig. VII. STENOCORVS *thorace inermi* DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender Stutzkäfer mit stachellosem Brustschilde

TABULA CXV.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. II.



Fig. V.




Fig. VI.



Fig. VII.



TABVLA CXVI.

Hundert und sechzehende Tafel.

- Fig. I. **LIBELLVLA** *alis erectis* **SEXTA.**
Sechstes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. II. III. **PHALAENA** *pectinicornis* *alis deflexis* **VICESIMA TERTIA.**
Drey und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. IV. **TENTHREDO** *antennis pectinatis* **QUINTA.**
Fünfte Sägfliege mit gekämmten Fühlhörnern.
- Fig. V. **ICHNEVMON** **QUINQVAGESIMVS NONVS.**
Neun und funfzigste Schlupfwespe.
- Fig. VI. **ICHNEVMON** **SEXAGESIMVS.**
Sechzigste Schlupfwespe.
- Fig. VII. **STENOCORVS** *thorace inermi* **DECIMVS QVARTVS.**
Vierzehender Stutzkäfer mit stachellosem Brustschilde.

TABVLA CXVII.

Hundert und siebenzehende Tafel.

Fig. I.

LIBELLVLA alis *erectis* SEPTIMA.

Siebendes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.

Fig. II.

VESPA DECIMA SEPTIMA.

Siebenzehende Wespe.

Fig. III.

VESPA DECIMA OCTAVA.

Achtzehende Wespe.

Fig. IV.

LIBELLVLA alis *erectis* OCTAVA.

Achtes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.

Fig. V.

LIBELLVLA alis *erectis* NONA.

Neuntes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.

Fig. VI.

TIPVLA alis *patentibus* DECIMA SEXTA. FEMINA.

Sechzehende Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.

Fig. VII.

PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* VICESIMA QVARTA.

Vier und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

TABVLA CXVII.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.






Fig. VII.



Fig. VIII.





TABVLA CXVIII.
Hundert und achtzehende Tafel.

Fig. I. *DERMESTES* *quartus*.
Vierter Speckkäfer.

Fig. II. III. *PHALAENA feticornis alis deflexis* *VICESIMA QUINTA*.
Fünf und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und ab-
hängenden Flügeln.

Fig. IV. *MVSCA spathula antennarum oblonga* *DECIMA SEXTA*.
Sechzehende Hausfliege mit länglichem Spadel.

Fig. V. VI. *PHALAENA feticornis alis deflexis* *VICESIMA SEXTA*.
Sechs und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und ab-
hängenden Flügeln.

Fig. VII. *STENOCORVS thorace inermi* *DECIMVS QVINTVS*.
Fünfzehender Stutzkäfer mit stachellosem Brustschild.

TABVLA CXIX.

Hundert und neunzehende Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *feticornis* alis *planis* DECIMA SEXTA.
Sechzehender Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.
- Fig. III. CIMEX *quatuor* antennarum articulis VICESIMVS TERTIVS.
Drey und zwanzigste Wanze mit *viergliedrigen* Fühlhörnern.
- Fig. IV. ICHNEVMON SEXAGESIMVS PRIMVS.
Ein und sechzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. ICHNEVMON SEXAGESIMVS SECVNDVS.
Zwey und sechzigste Schlupfwespe.
- Fig. VI. STRATIONYS NONA.
Neunte Waffenfliege.
- Fig. VII. VIII. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* VICESIMA SEPTIMA.
Sieben und zwanzigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.

TABVLA CXX.

Hundert und zwanzigste Tafel.

Fig. I. II. *PAPILIO hexapus* alis *angulatis* SECUNDVS.
Zweyter sechsfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. III. *MVSCA* *spathula antennarum rotunda* DECIMA SEXTA.
Sechzehende Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. IV. *LIBELLVLA* alis *erectis* DECIMA.
Zehendes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.

Fig. V. *LIBELLVLA* alis *erectis* VNDECIMA.
Eilftes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.

Fig. VI. *LIBELLVLA* alis *erectis* DVODECIMA.
Zwölftes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.

Fig. VII. *ICHNEVMON* SEXAGESIMVS TERTIVS.
Drey und sechzigste Schlupfwespe.

Fig. VIII. *ICHNEVMON* SEXAGESIMVS QVARTVS.
Vier und sechzigste Schlupfwespe.

TABVLA CXXI.

Hundert ein und zwanzigste Tafel.

Fig. I. II. TETIGONIA SECUNDA.
Zweyte Singfliege.

Fig. III. BOMBYLIUS SEPTIMUS.
Siebende Rüsselfliege.

Fig. IV. LIBELLULA alis erectis DECIMA TERTIA.
Dreyzehendes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.

Fig. V. LIBELLULA alis erectis DECIMA QUARTA.
Vierzehendes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.

TABULA CXXI.



Fig. I.



Fig. II.

Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



TABVLA CXXII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.




Fig. VI





Fig. VII.



TABVLA CXXII.
Hundert zwey und zwanzigste Tafel.

Fig. I. PHALAENA *seticornis* alis *deflexis* VICESIMA OCTAVA.
Acht und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und ab-
hängenden Flügeln.

Fig. II. III. PHRYGANEA *SEXTA*.
Sechste Frühlingsfliege.

Fig. IV. PHALAENA *pectinicornis* alis *patentibus* SEPTIMA.
Siebender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und offenen Flügeln.

Fig. V. PHALAENA *pectinicornis* alis *patentibus* OCTAVA.
Achter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und offenen Flügeln.

Fig. VI. VESPA *DECIMA NONA*.
Neunzehende Wespe.

Fig. VII. TABANVS *QVINTVS*.
Fünfte Bremsenfliege.

TABVLA CXXIII.

Hundert drey und zwanzigste Tafel.

Fig. I.

CERAMBYX DECIMVS TERTIVS.

Dreyzehender Holzkäfer.

Fig. II. III.

CIMEX *quatuor* antennarum articulis VICESIMVS QVARTVS.

Vier und zwanzigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.

Fig. IV.

CVRCVLIO femoribus *muticis* VICESIMVS QVINTVS.

Fünf und zwanzigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

Fig. V.

PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* NONA.

Neunter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.

Fig. VI.

PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* DECIMA.

Zehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.

TABVLA CXXIV.

Hundert vier und zwanzigste Tafel.

Fig. I. II.

PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und ab-
hangenden Flügeln.

Fig. III.

CERAMBYX DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender Holzkäfer.

Fig. IV.

TABANVS SEPTVS.
Sechste Bremsenfliege.

Fig. V.

MVSCA *spathula antennarum rotunda* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehende Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. VI.

ARANEA *oculorum situ quadrato* SEPTA.
Sechste Spinne mit Augen im Vierecke.

TABVLA CXXV.

Hundert fünf und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. LIBELLULA alis patentibus VNDECIMA.
Eilftes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. II. III. PHALAENA seticornis alis deflexis VICESIMA NONA.
*Neun und zwanzigster Nachtfalter mit borftigen Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.*
- Fig. IV. V. PHALAENA seticornis alis patentibus VNDECIMA.
Eilfter Nachtfalter mit borftigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. VI. TENTHREDO antennis clauatis DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. TENTHREDO antennis clauatis DECIMA QUINTA.
Vierzehende Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.

TABVLA CXXV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



TABULA CXXVI

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.




Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



TABVLA CXXVI.

Hundert sechs und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. *CHRYSOMELA TRIGESIMA PRIMA.*
Ein und dreyßigster Blattkäfer.
- Fig. II. *PHALAENA seticornis alis planis DECIMA SEPTIMA.*
Siebenzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügel.
- Fig. III. *PHALAENA seticornis alis deflexis DECIMA OCTAVA.*
Achtzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügel.
- Fig. IV. *TIPVLA alis patentibus DECIMA SEPTIMA.*
Siebenzehende Erdfliege mit offenen Flügeln.
- Fig. V. VI. *TENTHREDO antennis pectinatis SEXTA.*
Sechste Sägfliege mit gekämmten Fühlhörnern.
- Fig. VII. *LEPTVRA thorace conico DECIMA SEPTIMA.*
Siebenzehender Afterholzkäfer mit kegelförmlichem Brustschilde.
- Fig. VIII. *ICHNEVMON SEXAGESIMVS QVINTVS.*
Fünf und sechzigste Schlupfwespe.

TABVLA CXXVII.

Hundert sieben und zwanzigste Tafel.

Fig. I. II. *PAPILIO tetrapus alis integris SEPTIMVS.*
Siebender vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III. *VESPA VICESIMA.*
Zwanzigste Wespe.

Fig. IV. V. *PAPILIO tetrapus alis integris OCTAVVS.*
Achter vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. VI. *VESPA VICESIMA PRIMA.*
Ein und zwanzigste Wespe.

Fig. VII. *MORDELLA PRIMA.*
Erster Flohkäfer.

TABULA CXXVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. II.





Fig. I.



TABVLA CXXVIII.
Hundert acht und zwanzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *seticornis* alis *planis* DECIMA NONA.
Neunzehender Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen*
Flügeln.

Fig. III. BVPRESTIS DECIMA QUINTA. Vid. TAB. XLIX. Fig. I.
Fünfzehender Stinkkäfer.

Fig. IV. LEPTVRA *thorace cylindraceo* VNDECIMA.
Elfster Afterholzbock mit *walzenähnlichem* Brustschilde.

Fig. V. ICHNEVMON SEXAGESIMVS SEXTVS.
Sechs und sechzigste Schlupfwespe.

Fig. VI. ICHNEVMON SEXAGESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und sechzigste Schlupfwespe.

TABVLA CXXIX.

Hundert neun und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* TRICESIMA.
Dreyßigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. III. MVSCA *spathula antennarum rotunda* DECIMA OCTAVA.
Achtzehende Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. IV. MVSCA *spathula antennarum rotunda* DECIMA NONA.
Neunzehende Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. V. MVSCA *spathula antennarum rotunda* VICESIMA.
Zwanzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. VI. VII. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* TRICESIMA PRIMA.
Ein und dreyßigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

TABYLA CXXX.

Hundert und dreyfsigfte Tafel.

- Fig. I. PHALAENA *pectinicornis* alis planis. DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen
Flügeln.
- Fig. II. MVSCA *spathula antennarum rotunda* VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. III. TENTHREDO *antennis clauatis* DECIMA QUINTA.
Fünfzehende Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. ICHNEVMON *sexagesimus octavus*.
Acht und sechzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. TENEBRIO *antennarum articulis lentiformibus* QVARTVS.
Vierter Mehlkäfer mit linienförmigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. TABANVS *septimus*.
Siebende Bremsenfliege.

TABVLA CXXXI.

Hundert ein und dreyßigste Tafel.

PHALAENA *pedinicornis* alis *deflexis* VICESIMA QUINTA.

Fünf und zwanzigster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.

Fig. I. II.

TABANVS OCTAVVS.

Achte Bremsenfliege.

Fig. III.

TABANVS NONVS.

Neunte Bremsenfliege.

Fig. IV.

TABANVS DECIMVS.

Zehende Bremsenfliege.

Fig. V.

TABANVS VNDECIMVS.

Elfte Bremsenfliege.

Fig. VI.

TABVLA CXXXII.
Hundert zwey und dreyßigste Tafel.

Fig. I. II. *PAPILIO tetrapus alis angulatis* QVARTVS.
Vierter vierfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. III. *APIS* QVADRAGESIMA;
Vierzigste Biene.

Fig. IV. *ICHNEVMON* SEXAGESIMVS NONVS;
Neun und sechzigste Schlupfwespe.

Fig. V. *MPHEX* QVARTA;
Afterwespe.

TABVLA CXXXIII.

Hundert drey und dreyßigste Tafel.

Fig. I.

PLATYCERVS QVARTVS. MAS.

Vierter Kammkäfer. Männchen.

Fig. II.

PLATYCERVS QVINTVS. FEMINA.

Fünfter Kammkäfer. Weibchen.

Fig. III. IV.

PHALAENA *seticornis* alis *deflexis* VICESIMA SEXTA.

Sechs und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

TABVLA CXXXIV.

Hundert vier und dreyßigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* TRICESIMA SECVNDA.
Zwey und dreyßigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.

Fig. III. a. b. CHELIFER PRIMVS.
Erste Scorpionspinne.

Fig. IV. a. b. CYNIPS PRIMA.
Erste Gallapfelfliege.

Fig. V. a. b. GYRINVS PRIMVS.
Erster Taumelkäfer.

Fig. VI. a. b. LEPISMA PRIMA.
Erster Zuckergast.

TABVLA CXXXV.

Hundert fünf und dreyßigste Tafel.

Fig. I.

PHALAENA *pectinicornis* alis *patentibus* NONA.

Neunter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und offenen Flügeln.

Fig. II.

PHALAENA *pectinicornis* alis *patentibus* DECIMA.

Zehender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und offenen Flügeln.

Fig. III.

ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS.

Siebenzigste Schlupfwespe.

Fig. IV.

ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS PRIMVS.

Ein und siebenzigste Schlupfwespe.

Fig. V. VI.

SPHINX alis *integris* cauda *pilosa* QVARTA.

Vierter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und haarigem Schwanze.

TABVLA CXXXVI.

Hundert sechs und dreyßigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAFENA *pectinicornis* alis *deflexis* VICESIMA SEPTIMA.
Sieben und zwanzigster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.

Fig. III. VESPA VICESIMA SECUNDA. Vid. TAB. LIII. Fig. v.
Zwey und zwanzigste Wespe.

Fig. IV. V. ACRIDIUM QUARTUM.
Vierte Schnarrheuschrecke.

Fig. VI. APIS QUADRAGESIMA PRIMA.
Ein und vierzigste Biene.

TABVLA CXXXVII.

Hundert sieben und dreyßigste Tafel.

Fig. I. LIBELLVLA alis patentibus DVODECIMA.
Zwölftes Jüngerchen mit offenen Flügeln.

Fig. II. a. b. NEMOTELVS DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehende Stiletfliege.

Fig. III. CARABVS oblongus DECIMVS NONVS.
Neunzehender länglicher Laufkäfer.

Fig. IV. V. ACRIDIVM QVINTVM.
Fünfte Schnarrheuschrecke.

Fig. VII.




Fig. II.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. VIII.



Fig. VI.



Fig. III.



Fig. V.





Fig. IX.



TABULA CXXXVIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III.



Fig. III.



TABVLA CXXXVIII.
Hundert acht und dreyßigste Tafel.

Fig. I. II.

LOCVSTA QVINTA. MAS.
Fünfte Heuschrecke. Männchen.

Fig. III.

LOCVSTA SEXTA. FEMINA.
Sechste Heuschrecke. Weibchen.

Fig. IV.

LOCVSTA SEPTIMA.
Siebende Heuschrecke.

TABVLA CXXXIX.

Hundert neun und dreyßigste Tafel.

Fig. I. II.

PHALAENA *pectinicornis* a'is *deflexis* VICESIMA OCTAVA.

Acht und zwanzigster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.

Fig. III.

LOCVSTA OCTAVA. FEMINA.

Achte Heuschrecke. Weibgen.

Fig. IV. V.

LOCVSTA NONA. MAS.

Neunte Heuschrecke. Männchen.

TABVLA CXL.

Hundert und vierzigste Tafel.

Fig. I. **STENOCORVS** *thorace armato* **SEXTVS.**
Sechster Stutzkäfer mit stachelichem Brustschilde.

Fig. II. III. **PAPILIO** *hexapus alis integris* **NONVS.**
Neunter sechsfüssiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. IV. V. **PAPILIO** *hexapus alis integris* **DECIMVS.** *Vid. Tab. XL. Fig. III. IV.*
Zehender sechsfüssiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

TABVLA CXLI.

Hundert ein und vierzigste Tafel.

Fig. I. CARABVS *oblongus* VICESIMVS. *coniacus*
Zwanzigster länglicher Laufkäfer. Vid. TAB. XXXVI. Fig. I.


Fig. II. III. ACRIDIVM SEXTVM.
Sechste Schnarrheuschrecke.

Fig. IV. V. ACRIDIVM SEPTIMVM.
Siebende Schnarrheuschrecke.

Fig. I.



Fig. II.



TABULA CXLII.



Fig. I.




Fig. II.

Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VII. a.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII. b.



TABVLA CXLII.

Hundert zwey und vierzigste Tafel.

- Fig. I. II. *PAPILIO tetrapus alis angulatis* QUINTVS.
Fünfter vierfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.
- Fig. III. *MVSCA spathula antennarum oblonga* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehende Hausfliege mit länglichem Spadel.
- Fig. IV. *MVSCA spathula antennarum rotunda* DECIMA OCTAVA.
Achtzehende Hausfliege mit länglichem Spadel.
- Fig. V. VI. *ACRIDIVM OCTAVVM.* Vid. TAB. XXVII. Fig. VI. VII.
Achte Schnarrheuschrecke.
- Fig. VII. a. b. *CASSIDA SEXTA.*
Sechster Schildkäfer.

TABVLA CXLIII.

Hundert drey und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. *PAPILIO tetrapus alis integris* NONVS.
Neunter vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III. IV. *PAPILIO hexapus alis caudatis* QVINTVS.
Fünfter sechsfüßiger Tagfalter mit geschwänzten Flügeln.

Fig. V. a. b. *CYNIPS SECVNDA.*
Zweyte Gallapfelfliege.

TABULA CXLIV.

Fig. I.




Fig. II



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V



Fig. VI.



Fig. VII.

Fig. VIII.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.




Fig. IV.




Fig. V.




Fig. VI.



TABVLA CXLIV.

Hundert vier und vierzigste Tafel.

Fig. I. II.

PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* VICESIMA NONA.

Neun und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

Fig. III. IV.

FORFICVLA *SECUNDA*.

Zweyter Ohrkäfer.

Fig. V.

SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis TRICESIMVS.

Dreyszigster Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.

Fig. VI.

SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis TRICESIMVS PRIMVS.

Ein und dreyszigster Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.

Fig. VII.

SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis TRICESIMVS SECUNDVS.

Zwey und dreyszigster Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.

Scarab. Forson.

Fig. VIII.

SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis TRICESIMVS TERTIVS.

Drey und dreyszigster Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.

TABVLA CXLV.

Hundert fünf und vierzigste Tafel.

CERAMBYX DECIMVS QVINTVS.

Fig. I. II.

Fünfzehnder Holzkäfer.

PHALAENA feticornis alis conuolutis QVARTA.

Fig. III.

Vierter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und zusammengerollten Flügeln.

PHALAENA feticornis alis conuolutis QVINTA.

Fig. IV.

Fünfter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und zusammengerollten Flügeln.

PHALAENA feticornis alis conuolutis SEXTA.

Fig. V. VI.

Sechster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und zusammengerollten Flügeln.

PHALAENA feticornis alis conuolutis SEPTIMA.

Fig. VII. VIII.

Siebender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und zusammengerollten Flügeln.

TABULA CXLVI.

Hundert sechs und vierzigste Tafel.

Fig. I. II.

PAPILIO tetrapus alis angulatis SEXTVS.

Sechster vierfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. III. a. b.

ACARVS QVARTVS.

Vierte Milbe.

Fig. IV.

NEMOTELVS DECIMVS QVARTVS.

Vierzehende Stiletfliege.

Fig. V.

MVSCA spathula antennarum rotunda VICESIMA SECVNDA.

Zwey und zwanzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. VI.

MVSCA spathula antennarum rotunda VICESIMA TERTIA.

Drey und zwanzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

TABULA CXLVII.

Hundert sieben und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. SPHEX QUINTA.
Fünfte Afterwespe.

Fig. III. IV. PAPILIO tetrapus alis angulatis SEPTIMVS.
Siebender vierfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. V. CVLEX PRIMVS. FEMINA.
Erste Schnaakenfliege. Weibgen.

Fig. VI. CVLEX SECUNDVS. MAS.
Zweyte Schnaakenfliege. Männig

Fig. VII. VIII. EMPIS PRIMA.
Erste Schnepfenfliege.

TABULA CXLVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.




Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VIII.





Fig. VI.





TABVLA CXLVIII.

Hundert acht und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. *PAPILIO tetrapus alis angulatis* OCTAVVS.
Achter vierfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. III. IV. *PAPILIO tetrapus alis integris* DECIMVS
Zehender vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

TABVLA CXLIX.

Hundert neun und vierzigste Tafel.

Fig. I. II.

PAPILIO *hexapus* *alis angulatis* VNDECIMVS.
Eilfter sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III.

PAPILIO *hexapus* *alis integris* DODECIMVS.
Zwölfter sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. IV. V.

PAPILIO *hexapus* *alis integris* DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

TABULA CXLIX.



ELYTRA.

TAB. IX.


Fig. I.



Fig. III.



Fig. II.



TABVLA CL.
Hundert und funfzigste Tafel.

Fig. I. II. III. **BRANCHIPVS** *cancriformis* PRIMVS.
Erster krebsartiger Kiefenfufs.

Fig. IV. a. b. **BRANCHIPVS** *cancriformis* SECUNDVS.
Zweyter krebsartiger Kiefenfufs.

Fig. V. a. b. **BRANCHIPVS** *conchiformis* PRIMVS.
Erster muschelartiger Kiefenfufs.

TABVLA CLI.

Hundert ein und funfzigste Tafel.

Fig. I. II.

PHALAENA *feticornis* alis *planis* VICESIMA.

Zwanzigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III.

CLERVS QVARTVS.

Vierter Bienenkäfer.

Fig. IV.

SCARABAEVS *tribus* antennarum *lamellis* TRICESIMVS QVARTVS.

Vier und dreyßigster Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. V. VI.

ELATER *antennis ferratis* DVODECIMVS.


Zwölfter Springkäfer mit *sägförmigen* Fühlhörnern.

Fig. VII.

LEPTVRA *thorace globoso* DECIMA QVARTA.

Vierzehender Afterholzkäfer mit *kugeligem* Brustschilde.





TABVLA CLII.

Hundert zwey und funfzigste Tafel.

Fig. I. II. *PAPILIO tetrapus alis integris VNDECIMVS.*
Eilfter vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III. *PAPILIO tetrapus alis integris DVODECIMVS.*
Zwölfter vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. IV. *LEPTVRA thorace cylindraceo DVODECIMA.*
Zwölfter Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustfchilde.

TABVLA CLIII.

Hundert drey und funfzigfte Tafel.

- Fig. I. II. *PAPILIO tetrapus alis integris* DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. III. *TETIGONIA TERTIA.*
Dritte Singfliege.
- Fig. IV. a. b. *CERAMBYX DECIMVS SEXTVS.* Vid. TAB. I. Fig. I.
Sechzehender Holzkäfer.
- Fig. V. *LEPTVRA thorace cylindraceo* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.
Vid. TAB. XXXIX. Fig. I.

TABVLA CLIV.

Hundert vier und funfzigste Tafel.

Fig. I. II. EPHEMERA TERTIA.
Dritte Vferaasfliege.

Fig. III. IV. TENTHREDO antennis *pectinatis* SEPTIMA. MAS.
Siebende Sägfliege mit gekämmten Fühlhörnern. Männchen.

Fig. V. VI. TENTHREDO antennis *pectinatis* OCTAVA. FEMINA.
Achte Sägfliege mit gekämmten Fühlhörnern. Weibchen.

Fig. VII. VIII. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* TRICESIMA TERTIA.
Drey und dreyszigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.

Fig. IX. X. ACRIDIVM NONVM.
Neunte Schnarrheuschrecke.

TABVLA CLV.

Hundert fünf und funfzigfte Tafel.

Fig. I. ONISCVS TERTIVS.
Dritte Affel.

Fig. II. CVRCVLIO femoribus muticis VICESIMVS SEXTVS.
Sechs und zwanzigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.


Fig. III. a. b. BRVCHVS PRIMVS.
Erster Buckelkäfer.

Fig. IV. a. b. BRVCHVS SECVNDVS.
Zweyter Buckelkäfer.

Fig. V. a. b. BRVCHVS TERTIVS.
Dritter Buckelkäfer.

Fig. VI. BLATTA SECVNDA.
Zweyte Schabe.

Fig. VII. BLATTA TERTIA.
Dritte Schabe.





TABVLA CLVI.

Hundert sechs und funfzigste Tafel.

Fig. I. MVSCA *spathula antennarum rotunda* VICESIMA, QVARTA.
Vier und zwanzigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

Fig. II. III. EPHEMERA QVARTA.
Vierte Uferaasfliege.

Fig. IV. CARABVS *oblongus* VICESIMVS PRIMVS.
Ein und zwanzigster länglicher Laufkäfer.

Fig. V. VI. PHALAENA *feticornis alis deflexis* TRICESIMA QVARTA.
*Vier und dreyszigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.*

Fig. VII. TIPVLA *alis patentibus* DECIMA OCTAVA.
Achtzehende Erdfliege mit offenen Flügeln.

TABVLA CLVII.

Hundert sieben und funfzigste Tafel.

Fig. I.

BVPRESTIS DECIMA SEXTA.
Sechzehender Stinkkäfer.

Fig. II. III.

GRYLLVS SECVNDVS. MAS.
Zweyte Grille. Männgen.

Fig. IV.

GRYLLVS TERTIVS. FEMINA.
Dritte Grille. Weibgen.

Fig. V. VI.

PHRYGANEAE SEPTIMA.
Siebende Frühlingsfliege.

Fig. VII. a. b.

DERMESTIS QVINTVS.
Fünfter Speckkäfer.

TABULA CLVIII.

Hundert acht und funfzigste Tafel.

Fig. I.

LEPTVRA thorace cylindraceo DECIMA QVARTA.

Vierzehender Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.

Fig. II.

BLATTA QVARTA.

Vierte Schabe.

Fig. III. a. b.

CISTELA SECVNDA.

Zweyter Kegelkäfer.

Fig. IV. V.

PAPILIO hexapus alis angulatis SEXTVS.

Sechster sechsfüßiger Tagfalter mit geschwänzten Flügeln.

Fig. VI.

ARANEA oculorum situ quadrato SEPTIMA.

Siebende Spinne mit Augen im Vierecke.

Fig. VII.

ARANEA oculorum situ quadrato OCTAVA.

Achte Spinne mit Augen im Vierecke.

TABVLA CLIX.

Hundert neun und funfzigste Tafel.

Fig. I. II. *PHALAENA pectinicornis* alis erectis VICESIMA.
Zwanzigster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und aufrechten Flügeln.

Fig. III. IV. *TENTHREDO antennis pectinatis* NONA.
Neunte Sägfliege mit gekämmten Fühlhörnern.

Fig. V. *PTEROPHORVS secundus*.
Zweyter Fächerfalter.

Fig. VI. VII. *PHALAENA seticornis* alis planis VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

TABVLA CLX.

Hundert und sechzigste Tafel.

Fig. I. LIBELLVLA alis patentibus DECIMA TERTIA.
Dreyzehendes Jüngferchen mit offenen Flügeln.

Fig. II. III. PERLA TERTIA.
Dritte Afterfrühlingsfliege.

Fig. IV. V. APIS QVADRAGESIMA SECVNDA.
Zwey und vierzigste Biene.

Fig. VI. CVRCVLIO femoribus muticis VICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und zwanzigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

TABVLA CLXI.

Hundert ein und sechzigste Tafel.

- Fig. I. TIPVLA alis patentibus DECIMA NONA. MAS.
Neunzehende Erdfliege mit offenen Flügeln. Männchen.
- Fig. II, III. ACRIDIVM DECIMVM.
Zehende Schnarrheuschrecke.
- Fig. IV. CHRYSOMELA TRICESIMA SECUNDA.
Zwey und dreyßigster Blattkäfer.
- Fig. V. MVSCA spathula antennarum rotunda VICESIMA QUINTA.
Fünf und zwanzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. VI. ARANEA oculorum situ semilunato DECIMA QVARTA.
Vierzehende Spinne mit Augen im halben Monde.

TABVLA CLXII.

Hundert zwey und sechzigste Tafel.

- Fig. I. II. *PAPILIO hexapus alis obliquis PRIMVS.*
Erster sechsfüßiger Tagfalter mit schiefen Flügeln.
- Fig. III. IV. *PAPILIO hexapus alis obliquis SECVNDVS.*
Zweyter sechsfüßiger Tagfalter mit schiefen Flügeln.
- Fig. V. *TIPVLA alis patentibus VICESIMA. FEMINA.*
Zwanzigste Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.
- Fig. VI. *TIPVLA alis patentibus VICESIMA PRIMA. MAS.*
Ein und zwanzigste Erdfliege mit offenen Flügeln. Männchen.
- Fig. VII. VIII. *PAPILIO hexapus alis obliquis TERTIVS.*
Dritter sechsfüßiger Tagfalter mit schiefen Flügeln.

TABVLA CLXIII.

Hundert drey und fechzigfte Tafel.

- Fig. I. CVRCVLIO femoribus *muticis* VICESIMVS OCTAVVS.
Acht und zwanzigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. II. III. PHALAENA *feticornis* alis *conuolutis* VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühnhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. IV. V. PHALAENA *feticornis* alis *planis* VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühnhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. VI. CVRCVLIO femoribus *muticis* VICESIMVS NONVS.
Neun und zwanzigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

TABVLA CLXIV. -

Hundert vier und fechzigfte Tafel.

Fig. I. MVSCA spathula antennarum rotunda VICESIMA SEXTA.
Sechs und zwanzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. II. III. PAPILIO tetrapus alis integris DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. IV. V. PHALAENA seticornis alis deflexis TRICESIMA QVINTA.
Fünf und dreyßigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.

Fig. VI. VII. PHALAENA seticornis alis planis VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
flachen Flügeln.

TABVLA CXLV.

Hundert fünf und fechzigste Tafel.

Fig. I. II.

PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* SEPTIMVS.

Siebender sechsfüßiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.

Fig. III. IV.

SPHINX alis *integris* cauda *simplici* DECIMA TERTIA.

Dreyzehender Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.

Fig. V.

PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* TRICESIMA SEXTA.

Sechs und dreyßsigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

Fig. VI. VII.

MYSCA *spathula* antennarum *rotunda* VICESIMA SEPTIMA.

Sieben und zwanzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

TABVLA CLXVI.
Hundert sechs und sechzigste Tafel.

Fig. I. II. NEMOTELVS DECIMVS QVINTVS.
Fünfzehende Stiletfliege.

Fig. III. a. b. CVRCVLIO femoribus muticis TRICESIMVS.
Dreysigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

Fig. IV. a. b. CLERVS QVINTVS.
Fünfter Bienenkäfer.

Fig. V. a. b. ALTICA PRIMA.
Erster Hüpfkäfer.

TABVLA CLXVII.

Hundert sieben und sechzigste Tafel.

- Fig. I. **DERMESTES** *SEXTVS.*
sechster Speckkäfer.
- Fig. II. III. **MVSCA** *spathula antennarum rotunda* **VICESIMA OCTAVA.**
Acht und zwanzigste Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.
- Fig. IV. **LIBELLVLA** *alis patentibus* **DECIMA QVARTA.**
Vierzehendes Jüngferchen mit *offenen* Flügeln.
- Fig. V. VI. **TENTHREDO** *antennis setaceis* **DVODECIMA.**
Zwölfte Sägfleie mit *borstigen* Fühlhörnern.
- Fig. VII. **ARANEA** *oculorum situ semilunato* **DECIMA QVINTA.**
Fünfzehende Spinne mit *Augen im halben Monde.*

TABULA CLXVIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.




Fig. VII.



Fig. VIII.




Fig. II.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. IV.



TABVLA CLXVIII.

Hundert acht und sechzigste Tafel.

Fig. I. BOMBYLIVS OCTAVVS.
Achte Rüsselfliege.

Fig. II. III. PHRYGANEA OCTAVA.
Achte Frühlingsfliege.

Fig. IV. V. NEMOTELVS DECIMVS SEXTVS.
Sechzehende Stiletfliege.

Fig. VI. VII. PAPILIO hexapus alis ocellatis OCTAVVS.
Achter sechsfüssiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.

Fig. VIII. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS SECVNDVS.
Zwey und siebenzigste Schlupfwespe.

TABULA CLXIX.

Hundert neun und fechzigste Tafel.

Fig. I. II. III. *MVSCA* spathula antennarum *quadrata* PRIMA.
Erste Hausfliege mit viereckigem Spadel.

Fig. IV. V. *MVSCA* spathula antennarum *oblonga* DECIMA NONA.
Neunzehende Hausfliege mit länglichem Spadel.

Fig. VI. a. b. *CVRCVLIO* femoribus *muticis* TRICESIMVS PRIMVS.
Ein und dreyssigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

Fig. VII. *CIMEX* quatuor antennarum articulis VICESIMVS QVINTVS.
Fünf und zwanzigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.

TABVLA CLXX.

Hundert und fiebenzigste Tafel.

Fig. I.

CVRCVLIO femoribus *muticis* TRICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und dreyssigster Rüsselkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. II. III.

TENTHREDO antennis *setaceis* DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Sägfliede mit *borstigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. V.

CIMEX *quatuor* antennarum articulis VICESIMVS SEXTVS.
Sechs und zwanzigste Wanze mit *viergliedrigen* Fühlhörnern.

Fig. VI. VII.

MVSCA *spathula* antennarum *rotunda* VICESIMA NONA.
Neun und zwanzigste Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. VIII. IX.

MVSCA *spathula* antennarum *rotunda* TRICESIMA.
Dreyssigste Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

TABVLA CLXXI.

Hundert ein und siebenzigste Tafel.

Fig. I. a. b. **COCCINELLA VICESIMA.**
Zwanzigster Blattlauskäfer.

Fig. II. a. b. **COCCINELLA VICESIMA PRIMA.**
Ein und zwanzigster Blattlauskäfer.

Fig. III. a. b. **RHINOMACER DECIMVS QVINTVS.**
Fünfzehender Afterrüsselkäfer.

Fig. IV. V. VI. **PHRYGANEA NONA.**
Neunte Frühlingsfliege.

TABVLA CLXXII.

Hundert zwey und siebenzigste Tafel.

Fig. I. II. *PAPILIO hexapus alis integris* DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender sechsfüssiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III. *MVSCA spathula antennarum rotunda* TRICESIMA PRIMA.
Ein und dreyßigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. IV. V. *MVSCA spathula antennarum rotunda* TRICESIMA SECVNDV.
Zwey und dreyßigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

Fig. VI. *ARANEA oculorum situ semilunato* DECIMA SEXTA.
Sechzehender Spinne mit Augen im halben Monde.

Fig. VII. *ARANEA oculorum situ quadrato* NONA.
Neunte Spinne mit Augen im Vierecke.

19

TABVLA CLXXIII.

Hundert drey und siebenzigste Tafel.

- Fig. I. MVSCA *spathula antennarum rotunda* TRICESIMA TERTIA.
Drey und dreyssigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. II. III. PHALAENA *feticornis* alis ~~conscutis~~ VICESIMA QVINTA.
Fünf und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
flachen Flügeln.
- Fig. IV. a. b. CHRYSOMELA TRICESIMA TERTIA.
Drey und dreyssigster Blattkäfer.
- Fig. V. VI. PHALAENA *pectinicornis* alis *erectis* SECVNDÆ.
Zweyter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und aufrechten Flügeln.

TABVLA CLXXIV.

Hundert vier und siebenzigste Tafel.

- Fig. I. LIBELLVLA alis *patentibus* DECIMA QVINTA.
Fünfzehendes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. II. ARANEA oculorum situ *semilunato* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehende Spinne mit Augen im halben Monde.
- Fig. III. ARANEA oculorum situ *quadrato* DECIMA.
Zehende Spinne mit Augen im Vierecke.
- Fig. IV. ELATER antennis *setaceis* DECIMVS.
Zehender Springkäfer mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. V. a. b. CVRCYLIO femoribus *muticis* TRICESIMVS TERTIVS.
Drey und dreszigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

TABVLA CLXXV.

Hundert fünf und siebenzigste Tafel.

Fig. I. II. EPHEMERA QVINTA. MAS.
Fünfte Uferaasfliege. Männchen.

Fig. III. EPHEMERA SEXTA. FEMINA.
Sechste Uferaasfliege. Weibchen.

Fig. IV. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS SEPTIMVS. FEMINA, aptera.
Drey und siebenzigste Schlupfwespe. Weibchen, ohne Flügel.

Fig. V. VI. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS QVARTVS. MAS, alatus.
Vier und siebenzigste Schlupfwespe. Männchen, mit Flügeln.

Fig. VII. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS QVINTVS.
Fünf und siebenzigste Schlupfwespe.

TABVLA CLXXVI.
Hundert sechs und siebenzigste Tafel.

Fig. I. LIBELLVLA *alis erectis* DECIMA QVINTA.
Funfzehendes Jüngerchen mit aufgerichteten Flügeln.

Fig. II. III. PHALAENA *feticornis* *alis planis* VICESIMA SEXTA.
Sechs und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. IV. a. b. ANTHRENVS PRIMVS.
Erster Blumenstaubkäfer.

Fig. V. a. b. CERAMBYX DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzehender Holzkäfer.

Fig. VI. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS SEXTVS. FEMINA, aptera.
Sechs und siebenzigste Schlupfwespe, Weibgen, ohne Flügel.

TABVLA CLXXVII.

Hundert sieben und siebenzigste Tafel.

Fig. I. MVSCA *spathula antennarum rotunda* TRICESIMA QVARTA.
Vier und dreyßigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. II. III. MVSCA *spathula antennarum rotunda* TRICESIMA QVINTA.
Fünf und dreyßigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. IV. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und siebenzigste Schlupfwespe.

Fig. V. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS OCTAVVS.
Acht und siebenzigste Schlupfwespe.

Fig. VI. VII. SPHEX SEXTA.
Sechste Afterwespe.

Fig. VIII. IX. SPHEX SEPTIMA.
a. b. *Siebende Afterwespe.*

18

TABULA CLXXIII.
Hundert acht und siebenzigste Tafel.

Fig. I. II. *MUSCA* *spathula antennarum rotunda* TRICESIMA SEXTA.
Sechs und dreyssigste Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. III. IV. *PHALAENA* *pellinicornis* *alis deflexis* TRICESIMA. MAS.
Dreysszigster Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhängenden*
Flügeln. *Männchen*.

Fig. V. VI. *PHALAENA* *feticornis* *alis deflexis* TRICESIMA PRIMA. FEMINA.
Ein und dreyssigster Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln. *Weibchen*.

TABVLA CLXXIX.

Hundert neun und siebenzigste Tafel.

Fig. I. TENTHREDO *antennis filiformibus* SEXTA.
Sechste Sägfliege mit fadenähnlichen Fühlhörnern.

Fig. II. III. MVSCA *spathula antennarum oblonga* VICESIMA.
Zwanzigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

Fig. IV. V. PHALAENA *feticornis alis deflexis* TRICESIMA SEPTIMA.
Sieben und dreyßigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.

Fig. VI. VII. NEMOTELVS DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzehende Stiletfliege.

Fig. VIII. IX. HIPPOBOSCA TERTIA.
Dritte Pferdfliege.

TABVLA CLXXX.

Hundert und achtzigste Tafel.

Fig. I. II. *PHRYGANEA DECIMA.*
Zehende Frühlingsfliege.

Fig. III. IV. *MVSCA spathula antennarum rotunda TRICESIMA SEPTIMA.*
Sieben und dreyßigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.
Vid. TAB. CLXXIII. Fig. I. II.

Fig. V. *PHALAENA feticornis alis planis VICESIMA SEPTIMA.*
Sieben und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. VI. *ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS NONVS.*
Neun und siebenzigste Schlupfwespe.

TABVLA CLXXXI.

Hundert ein und achtzigste Tafel.

Fig. I. TIPVLA alis patentibus VICESIMA SECUNDA. FEMINA.
Zwey und zwanzigste Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.

Fig. II. TIPVLA alis patentibus VICESIMA TERTIA. FEMINA.
Drey und zwanzigste Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.

Fig. III. TIPVLA alis patentibus VICESIMA QUARTA. MAS.
Vier und zwanzigste Erdfliege mit offenen Flügeln. Männgen.

Fig. IV. MVSCA spathula antennarum rotunda TRICESIMA OCTAVA.
Acht und dreyssigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. V. VI. TENTHREDO antennis clauatis DECIMA SEXTA.
Sechzehende Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.

Fig. VII. MVSCA spathula antennarum oblonga VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

TABVLA CLXXXII.

Hundert zwey und achtzigste Tafel.

Fig. I. LIBELLVLA *alis patentibus* DECIMA SEXTA.
Sechzehendes Jüngerchen mit offenen Flügeln.

Fig. II. III. TABANVS *DVODECIMVS.*
Zwölfte Bremsenfliege.

Fig. IV. LEPTVRA *thorace conico* DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.

Fig. V. VI. PHALAENA *seticornis alis planis* VICESIMA OCTAVA.
Acht und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

TABVLA CLXXXIII.

Hundert drey und achtzigste Tafel.

- Fig. I. *CIMEX* quatuor antennarum articulis VICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und zwanzigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. II. III. *PAPILIO* tetrapus alis integris DECIMVS QVINTVS.
Fünfzehender vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. IV. *TIPVLA* alis patentibus VICESIMA QVINTA. FEMINA.
Fünf und zwanzigste Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.
- Fig. V. *TIPVLA* alis patentibus VICESIMA SEXTA. MAS.
Sechs und zwanzigste Erdfliege mit offenen Flügeln. Männgen.
- Fig. VI. *ASILVS* DECIMVS QVINTVS.
Fünfzehende Raubfliege.
- Fig. VII. *ICHNEVMON* OCTOGESIMVS.
Achtzigste Schlupfwespe.

TABVLA CLXXXIV.

Hundert vier und achtzigste Tafel.

Fig. I. LIBELLVLA *alis erectis* DECIMA SEXTA.
Sechzehendes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.

Fig. II. III. PAPILIO *hexapus alis integris* DECIMVS QVINTVS.
Fünfzehender: sechsfüssiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. IV. V. TABANVS DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehende Bremsenfliege.

Fig. VI. VII. TABANVS DECIMVS QVARTVS.
Vierzehende Bremsenfliege.

TABVLA CLXXXV.

Hundert fünf und achtzigste Tafel.

Fig. I. II. *PAPILIO hexapus alis ocellatis* NONVS.
Neunter sechsfüßiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.

Fig. III. *ASILVS DECIMVS SEXTVS.*
Sechzehende Raubfliege.

Fig. IV. a. b. V. *CIMEX quatuor antennarum articulis VICESIMVS OCTAVVS.*
Acht und zwanzigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.

TABVLA CLXXXV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.a.



Fig. V.b.



TABVLA CLXXXVI.

Fig. I.



Fig. IV.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



TABVLA CLXXXVI.

Hundert sechs und achtzigste Tafel.

Fig. I.

LIBELLVLA alis *patentibus* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehendes Jüngferchen mit offenen Flügeln.

Fig. II.

TENTHREDO antennis *setaceis* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehende Sägfliege mit borstigen Fühlhörnern.

Fig. III.

TENTHREDO antennis *clauatis* DECIMA OCTAVA.
Achtzehende Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.

Fig. IV.

CLEROIDES PRIMVS.
Erster Afterbienenkäfer.

Fig. V.

CLEROIDES SECUNDVS.
Zweyter Afterbienenkäfer.

TABVLA CLXXXVII.

Hundert sieben und achtzigste Tafel.

Fig. I. a. b. ICHNEVMON OCTOGESIMVS PRIMVS.
Ein und achtzigste Schlupfwespe.

Fig. II. III. MVSCA spathula antennarum oblonga VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

Fig. IV. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS QVARTVS.
Vier und zwanzigster Fallkäfer.

Fig. V. ARANEA oculorum situ quatuor linearum TERTIA.
Dritte Spinne mit Augen in vier Reihen.

Fig. VI. ARANEA oculorum situ linearum QVARTA.
Vierte Spinne mit Augen in vier Reihen.

Fig. VII. ARANEA oculorum situ quatuor semilunato DECIMA OCTAVA.
Achtzehende Spinne mit Augen im halben Monde.

TABVLA CLXXXVIII.

Hundert acht und achtzigste Tafel.

Fig. I. II. NEMOTELVS DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehende Stiletfliege.

Fig. III. a. b. NOTOXVS PRIMVS.
Erster Brufthornkäfer.

Fig. IV. V. MVSCA *spathula antennarum oblonga* VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

Fig. VI. VII. CVLEX TERTIVS.
Dritte Schnaakenfliege.

TABVLA CLXXXIX.

Hundert neun und achtzigste Tafel.

- Fig. I. *BOSTRICHVS PRIMVS.*
Erster Capuzkäfer.
- Fig. II. *LEPTVRA thorace cylindraceo DECIMA QVINTA.*
Funfzehender Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.
- Fig. III. a. b. *TELEPHORVS ouatus SEXTVS.*
Sechster eyrunder Warzenkäfer.
- Fig. IV. V. *PHALAENA feticornis alis deflexis TRICESIMA OCTAVA.*
Acht und dreyssigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. VI. *ARANEA oculorum situ quatuor linearum QVINTA.*
Fünfte Spinne mit Augen in vier Reihen.
- Fig. VII. *ARANEA oculorum situ semilunato DECIMA NONA.*
Neuazehende Spinne mit Augen im halben Monde.

TABVLA CXC.

Hundert und neunzigste Tafel.

- Fig. I. II. *LOCVSTA DECIMA. MAS.*
Zehende Heuschrecke. Männgen.
- Fig. III. *LIBELLVLA alis patentibus DECIMA OCTAVA.*
Achtzehendes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. IV. V. *TENTHREDO antennis clauatis DECIMA NONA.*
Neunzehende Sägfliede mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. *APIS QVADRAGESIMA TERTIA.*
Drey und vierzigste Biene.
- Fig. VII. *VESPA VICESIMA TERTIA.*
Drey und zwanzigste Wespe.

TABVLA CXCI.

Hundert ein und neunzigste Tafel.

Fig. I. NEMOTELVS DECIMVS NONVS.
Neunzehende Stiletfliege.

Fig. II. III. TENTHREDO *antennis setaceis* DECIMA QVARTA.
Vierzehende Sägfleie mit borstigen Fühlhörnern.

Fig. IV. ARANEA *oculorum situ quadrato* VNDECIMA.
Eilfte Spinne mit Augen im Vierecke.

Fig. V. VI. NEMOTELVS VICESIMVS.
Zwanzigste Stiletfliege.

Fig VII. VIII. NEMOTELVS VICESIMVS PRIMVS.
Ein und zwanzigste Stiletfliege.

TABVLA CXCII.
Hundert zwey und neunzigste Tafel.

- Fig. I. EMPIS SECUNDA.
Zweyte Schnepfenfliege.
- Fig. II. EMPIS TERTIA.
Dritte Schnepfenfliege.
- Fig. III. a. b. EMPIS QVARTA.
Vierte Schnepfenfliege.
- Fig. IV. V. APIS QVADRAGESIMA QVARTA.
Vier und vierzigste Biene.
- Fig. VI. CERAMBYX DECIMVS OCTAVVS
Achtzehender Holzkäfer.

TABVLA CXCIH.

Hundert drey und neunzigste Tafel.

Fig. I. PHALAENA *seticornis* alis *patentibus* DVODECIMA.
Zwölfter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.

Fig. II. III. MVSCA *spathula antennarum oblonga* VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

Fig. IV. V. MVSCA *spathula antennarum rotunda* TRICESIMA NONA.
Neun und dreyszigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. VI. VII. MVSCA *spathula antennarum rotunda* QVADRAGESIMA.
Vierzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

203

TABVLA CXCIV.
Hundert vier und neunzigste Tafel.

- Fig. I. *ELATER* *antennis setaceis* VNDECIMVS.
Eilfter Springkäfer mit bürftigen Fühlhörnern.
- Fig. II. III. *TENTHREDO* *antennis clauatis* VICESIMA.
Zwanzigfte Sägfliede mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. *CHRYSOMELA* TRICESIMA QVARTA.
Vier und dreyßigster Blattkäfer.
- Fig. V. VI. *PHALAENA* *feticornis* *alis deflexis* VICESIMA NONA.
Neun und zwanzigster Nachtfalter mit bürftigen Fühlhörnern und
flachen Flügeln.
- Fig. VII. *CARABVS* *oblongus* VICESIMVS SECVNDVS. *latus*
Zwey und zwanzigster länglicher Laufkäfer.

TABVLA CXCV.

Hundert fünf und neunzigste Tafel.

- Fig. I. II. *MVSCA* *spathula antennarum rotunda* *QVADRAGESIMA PRIMA.*
Ein und vierzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. III. IV. *ICHNEVMON* *OCTOGESIMVS SECVNDVS.*
Zwey und achtzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. VI. *PHALAENA* *feticornis alis planis* *TRICESIMA.*
Dreyßigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. VII. VIII. *APIS* *QVADRAGESIMA QVINTA.*
Fünf und vierzigste Biene.

TABVLA CXCVI.
Hundert sechs und neunzigste Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *seticornis* alis *planis* TRICESIMA PRIMA.
Ein und dreyszigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.
- Fig. III. TIPVLA alis *patentibus* VICESIMA SEPTIMA.
Sieben und zwanzigste Erdfliege mit *offenen* Flügeln.
- Fig. IV. V. PHRYGANEAE VNDECIMA.
Elfte Frühlingsfliege.
- Fig. VI. ARANEA *oculorum situ quadrato* DVODECIMA.
Zwölfte Spinne mit *Augen im Vierecke*.

TABVLA CXCVII.

Hundert sieben und neunzigste Tafel.

Fig. I. II. *TENTHREDO* *antennis setaceis* DECIMA QVINTA.
Funfzehende Sägfliete mit borftigen Fühlhörnern.

Fig. III. IV. *PHALAENA* *seticornis* *alis deflexis* TRICESIMA SECVNDA.
Zwey und dreysßzigfter Nachtfalter mit borftigen Fühlhörnern und
flachen Flügeln.

Fig. V. VI. *APIS* QVADRAGESIMA SEXTA.
Sechs und vierzigste Biene.

Fig. VII. VIII. *MVSCA* *spathula antennarum rotunda* QVADRAGESIMA SECVNDA.
Zwey und vierzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.




Fig. VIII.





Fig. II.

Fig. III.

Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.




Fig. VII.

Fig. VIII.



TABVLA CXCVIII.

Hundert acht und neunzigste Tafel.

Fig. I. II. APIS QUADRAGESIMA SEPTIMA.
Sieben und vierzigste Biene.

Fig. III. ICHNEVMON OCTOGESIMVS TERTIVS.
Drey und achtzigste Schlupfwespe.

Fig. IV. V. STRATIONYS DECIMA.
Zehende Waffenfliege.

Fig. VI. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS QVINTVS.
Fünf und zwanzigster Falkkäfer.

Fig. VII. LEPTVRA thorace conico DECIMA NONA.
Neunzehender Afterholzkäfer.

Fig. VIII. SCARABAEVS tribus antennarum lamellis TRICESIMVS QVINTVS.
*Fünf und dreszigster Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühl-
hörnern.*

TABVLA CXCIX.

Hundert neun und neunzigste Tafel.

Fig. I. II. *CIMEX quatuor antennarum articulis VICESIMVS NONVS.*
Neun und zwanzigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.

Fig. III. *ARANEA oculorum situ semilunato VICESIMA.*
Zwanzigste Spinne mit Augen im halben Mond

Fig. IV. V. *CIMEX quatuor antennarum articulis TRICESIMVS.*
Dreyszigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.

Fig. VI. VII. *CIMEX quatuor antennarum articulis TRICESIMVS PRIMVS.*
Ein und dreyszigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.

Fig. VIII. *ELATER antennis ferratis DECIMVS TERTIVS.*
Dreyzehender Springkäfer mit sägformigen Fühlhörnern.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VIII.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. I.



Fig. II.

